Análise Sinótica

23 October 2013 - 00Z

Análise 250 hPa

Na análise da carta sinótica de 250 hPa da 00Z do dia 23/10, observa-se uma área anticiclônica cujo centro está posicionado em aproximadamente 10°S/70°W que estende uma crista na direção sudeste alcançando o estado de GO. O eixo de um cavado pode ser observado na divisa entre MG e BA e prosseguindo na direção noroeste, por sobre o TO, nordeste do MT e sul do PA (onde não está bem configurado). Os ramos do Jato Subtropical (JST) e Jato Polar Norte (JPN) aparecem quase acoplados e com pequena curvatura anticiclônica entre 30°S-45°S (aproximadamente) se estendendo desde o oceano Pacífico até o Atlântico. Entre o MS e sul do MT há um cavado de onda curta embutido no escoamento. O padrão anticiclônico juntamente com a presença da crista associada inibe a formação de nebulosidade significativa sobre o norte do Paraguai, MS sul do MT, norte do PR e SP. Por outro lado o cavado entre o Sudeste e o Norte do Brasil aumenta a instabilidade na vanguarda do seu deslocamento (TO, sul do PA, e sudeste do AM). O acoplamento dos JST e JPN intensifica o levantamento e aumenta a instabilidade baroclínica sobre áreas do RS, SC, sul do Paraguai, Uruguai, norte da Argentina e Buenos Aires. Ao sul de 40°S se observa um cavado de onda longa que estende seu eixo desde o oceano Pacífico tropical, passando por sobre o Chile e Argentina até o Atlântico subtropical que aumenta a instabilidade principalmente sobre áreas da Patagônia e centro-leste Argentino, associado ao um sistema frontal em superfície. Um ramo do Jato Polar Sul ? JPS pode ser observado sobre o sul do continente.

Análise 500 hPa

Na análise da carta sinótica de 500 hPa da 00Z do dia 23/10, observa-se uma ampla área com circulação anticiclônica, cujo centro está posicionado entre o norte do PR e o sul de MG. O padrão anticiclônico domina grande parte do território brasileiro, atuando desde o PR, Região Sudeste, oeste e centro-sul da BA, todo o Centro-Oeste e o sul da região Amazônica. O predomínio desta circulação neste nível dificulta o desenvolvimento de nuvens em sua área de atuação, pois, gera subsidência no ar que leva ar mais seco para as camadas mais baixas da troposfera, além de favorecer a elevação da temperatura e ocorrência de tempo seco devido à compressão adiabática. Sobre o continente a área com maior baroclinia juntamente com a presença de cavados de onda curta pode ser observada entre 28°S e 40°S (aproximadamente) onde se observa um forte gradiente de geopotencial, de temperatura e ventos fortes. Mais ao sul há outra área bastante baroclínica associada ao escoamento e deslocamento de cavados de onda curta. É importante comentar que o cavado comentado no nível de 250 hPa também tem reflexo neste nível sendo que o eixo pode ser observado se estende desde o Pacífico, passando pelo centro do Chile, patagônia Argentina e Atlântico.

Análise 850 hPa

Na análise da carta sinótica de 850 hPa da 00Z do dia 23/10, verifica-se que a circulação associada ao anticiclone subtropical do Atlântico Sul em superfície predomina em quase todo território brasileiro estendendo uma crista que alcança o oeste do AM. No litoral norte do Nordeste do Brasil entre RN e o MA, observa-se o fluxo dos ventos com velocidade superior a 10 KT. Entre o MA e o AP o escoamento é de nordeste, que favorece o transporte de umidade para áreas da Região Norte. Sobre o oeste da Amazônia se observa escoamento em direção sul/sudeste (com velocidade em torno de 10 KT), que favorece o transporte de massa e umidade da Amazônia para áreas da Bolívia, Argentina, RS e Uruguai, configurando o Jato de Baixos Níveis (JBN), sobre o sul da Bolívia e Paraguai o escoamento é basicamente de sul que juntamente com o padrão descrito nos níveis anteriores favorece a instabilidade sobre áreas do Sul do Brasil, Uruguai, norte da Argentina e sul Paraguai. A isoterma de zero grau chega a 40°S (aproximadamente) sobre a Argentina, indicando a presença de ar mais frio ao sul desta linha. Entre o oceano Pacífico adjacente a o norte do Chile, centro da Argentina e oceano Atlântico subtropical se observa o eixo do cavado (já comentado nos outros níveis) que está associado ao sistema frontal em superfície. Sobre a faixa leste do Sudeste se observa atuação do ASAS e os resquícios do anticiclone pós-frontal, através do padrão de circulação anticiclônica sobre essas áreas com velocidade do vento superior a 10 KT, principalmente sobre o sul do RJ, leste de SP, leste do PR, de SC e nordeste do RS.

Superfície

Na análise da carta sinótica de superfície da 00Z de hoje (23/10), observa-se a onda frontal com baixa pressão de 996 hPa posicionada em aproximadamente 43°S/25°W cujo ramo frio se estende em direção ao Sudeste brasileiro o anticiclone pós-frontal associado tem valor de 1020 hPa posicionado em aproximadamente 35°S/41°W e atua principalmente no leste do Uruguai faixa leste da Região Sul e litoral de SP. Entre o Paraguai e noroeste do RS se observa um cavado. Um sistema frontal cuja baixa pressão está localizada em torno 53°S/50°W estende seu ramo frio ao Golfo de San Matias e sul da província de Chubut (Argentina). Sobre o oceano Pacífico o Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) é observado enfraquecido com um núcleo de 1028 hPa centrado em torno de 43°S/95°W e deslocado de sua posição climatológica. O Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) tem valor de 1032 hPa centrada a leste de 20°W. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) oscila em torno de 06°N/11°N no Pacífico e no Atlântico por volta de 05°N/09°N.

Satélite

23 October 2013 - 00Z

Previsão

Nesta quarta-feira (23/10) as condições termodinâmicas determinarão as condições de tempo principalmente sobre a Região Norte e Centro-Oeste, entre o norte de SP, triângulo Mineiro e norte do PR. Na Região Nordeste a circulação associada ao ASA (que está afastado do continente) juntamente com a presença de uma massa de ar relativamente mais seca deixará o dia com pouca nebulosidade na faixa litorânea da Região e com predomínio de sol na área interior da mesma. Em grande parte da Região Sudeste a atuação de um anticiclone no nível de 500 hPa e o padrão anticiclônico associado ao ASAS deixará o dia com poucas nuvens e possibilidade chuva apenas em algumas áreas serranas de MG, oeste do RJ e Vale do Paraíba devido ao efeito orográfico e o deslocamento de cavados de onda curta. Na Região Sul a interação do escoamento nos altos níveis juntamente com a divergência e a presença de uma área de baixa pressão e a aproximação de um sistema frontal até o final do dia de hoje intensificará a instabilidade sobre áreas do RS, SC e sul do PR. Neste dia em várias localidades destas áreas citadas a chuva será intensa acompanhada de ventanias, raios e queda de granizo. Não se descarta a ocorrência de acumulado significativo de chuva, principalmente, no centro-norte do RS e oeste de SC. O deslocamento do sistema frontal pelo sul do Brasil que alcançará o PR até o final deste dia quinta deverá favorecer a ocorrência de chuva sobre o estado gaúcho e o Catarinense na quinta-feira (24/10) que deverá gerar acumulados significativos de chuva. Neste dia a frente fria estará oscilando de forma estacionária pelo Sul do país, Na sexta-feira (25/10) a frente fria já estará se afastando do continente, desta forma a circulação associada ao anticiclone pós-frontal já estará atuando principalmente sobre a faixa leste do Sudeste e do Sul deixando o dia encoberto e com chuva. No sábado (26/10) o anticiclone pós-frontal já estará se afastando do continente, porém, a circulação associada e a formação de uma nova onda frontal favorecerá a ocorrência de chuva em grande parte da Região Sul do Brasil. No domingo (27/10) a onda frontal estará afastada do continente e as condições termodinâmicas determinarão as condições de tempo em grande parte do Brasil.

Com relação aos modelos de previsão de chuva acumulada em 24h pode se dizer que são coerentes em relação ao posicionamento da chuva para o dia de hoje (23/10), sendo que o modelo T299 difere na intensidade da chuva sobre o RS e MT. Para quinta-feira (24/10) os mesmos apresentarão boa concordância.

Elaborado pelo Meteorologista Pedro Nazareno Ferreira da Costa

Mapas de Previsão

24 horas

48 horas

Mapas de Previsão

72 horas

96 horas

120 horas